

Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его возбудителем является бактерия *Mycobacterium tuberculosis*. Заразиться может каждый.

Заболевание излечимо, но лечение занимает длительное время. Огромное значение имеет ранняя диагностика туберкулеза - чем скорее он будет выявлен, тем меньше осложнений вызовет. Туберкулез передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.

Микобактерии находятся в мельчайших каплях, которые больной туберкулезом выделяет при разговоре, кашле, чихании и т.д. Выделяет микобактерии не каждый больной туберкулезом, а только тот, у кого происходит распад легочной ткани и бактериовыделение (в просторечии – открытая форма туберкулеза). Получить дозу микобактерий можно, даже не контактируя непосредственно с больным человеком, так как они способны оседать на частичках пыли и оставаться на ней при благоприятных условиях до 18 дней.

Среди взрослого населения в группу риска по заражению туберкулезом входят:

пожилые люди,

лица, страдающие хроническими заболеваниями (такими, как сахарный диабет, аутоиммунные заболевания),

люди с онкологическими заболеваниями,

люди, принимающие иммуносупрессивные препараты,

пациенты, перенесшие тяжелые операции,

курильщики.

Дети чрезвычайно восприимчивы к инфекциям, а отсутствие прививок (БЦЖ) приводит к тому, что, встретив туберкулезную палочку, организм не распознает ее как чужеродный агент и не выделяет антитела для борьбы с инфекцией, а вместо этого дает бактериям возможность беспрепятственно проникнуть в легкие.

✧ Симптомы туберкулеза легких

Выраженная слабость, утомляемость, хроническая усталость.

Бессонница, ночные кошмары.

Снижение аппетита и потеря массы тела.

Ночная потливость (она может быть настолько сильной, что больному приходится менять постельное белье).

Повышение температуры тела, в основном до субфебрильных значений, то есть не выше 37,5°C. Температура держится постоянно и сопровождается ознобом.

Кашель. Сначала больных беспокоит сухой кашель, но по мере прогрессирования заболевания появляется мокрота.

Кровохарканье. Характерно для более поздних стадий туберкулеза.

Боль в грудной клетке. Возникающая при кашле боль свидетельствует о вовлечении плевры в патологический процесс.

Сильная одышка. Если у вас появились вышеуказанные симптомы, немедленно обращайтесь к участковому врачу!!! Ежегодно проходите флюоро обследование!!!

ТУБЕРКУЛЕЗ

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями – *Mycobacterium tuberculosis* (палочка Коха)

Туберкулез легко передается при поцелуях и даже через совместное курение одной сигареты.

В домашней пыли микобактерии сохраняются до 3 месяцев



Пути распространения инфекции

воздушно-капельный

Как? При кашле, чихании, разговоре в составе мельчайших капель

контактно-бытовой

Как? Через вещи, которыми пользовался больной

пищевой

Как?

Через молоко больной коровы, яйца



Симптомы туберкулеза



Озноб



Усталость



Потеря веса



Боль в груди



Кровохарканье



Повышенная температура тела



Потеря аппетита



Раздражительность



Кашель